



LEI
Salud Veterinaria

Piroplasmosis



Av. Gran Canal s/n, locales 3 y 4, Col. Casas Alemán
Ampliación. Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07580,
Ciudad de México, México.



Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hrs



55 7901 5296



DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO



<https://lei.mx/soluciones-servicios-veterinarios/>



Solicita tu servicio vía WhatsApp [aquí](#)

Piroplasmosis mediante la técnica de tinción de frotis sanguíneo

¿Para qué sirve?

La piroplasmosis equina es una enfermedad causada por los parásitos protozoarios intraeritrocíticos *Theileria equi* o *Babesia caballi*, se transmite principalmente por garrapatas. Puede afectar a caballos, burros, mulas y cebras. La tasa de mortalidad de los caballos infectados puede alcanzar hasta el 50% de la población.

Para el diagnóstico de la piroplasmosis se pueden utilizar métodos directos (visualización de los parásitos en frotis sanguíneo), PCR o indirectos como ELISA mediante la detección de anticuerpos.

El frotis sanguíneo es un extendido de sangre periférica que sirve para analizar los componentes presentes en la circulación sanguínea, así como para la detección de hemoparásitos.

Información de la prueba

- Método: Examen microscópico mediante frotis sanguíneo para la detección de parásitos en sangre; utilizando métodos de tinción como Giemsa, Wright o Diff Quick.
- Muestras recomendadas: Sangre Completa
- Conservación y envío de la muestra: Tomar la muestra en tubo con anticoagulante (EDTA) y enviar en refrigeración.

**CONSULTE
NUESTROS PRECIOS**

Tiempo de entrega:
 **24 HRS.**

En México de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), la piroplasmosis es una enfermedad perteneciente al grupo 3 de las enfermedades exóticas y endémicas de notificación obligatoria y los animales infectados están sujetos a protocolos que restringen su movimiento y comercio internacional.

